

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 1

Gener 2012

Com en anys precedents continuarem amb l'edició dels butlletins de tractaments amb la modesta intenció de que siguin útils i contribueixin a millorar les recomanacions de tractaments pel control de plagues, malalties i fitorreguladors en fruiters. Els productes nous incorporats al catàleg de C.Q.Massó aniran essent recomanats en aquests butlletins.

► Perera - Psila i Poll San José -

L'estratègia de control de Psila es important iniciar-la en aquests moments per tal de reduir els nivells de població al inici del període vegetatiu. Avançant el tractament d'**Atominal 10 EC** al inici del període de vol i posta de Psila aconseguim el control simultani de Poll de San José i posta hivernal de Psila (sempre que aquesta tingui coloració blanca).

Els controls de l'evolució del vol de la Psila posen de manifest que durant la 2^a quinzena de Gener a la zona frutera de Lleida els adults hivernants faran acte de presència a les plantacions de pera, iniciant tot seguit la posta.

Cal tractar en dies solejats amb $T > 10^{\circ}\text{C}$, durant les hores centrals del dia.

Estratègia -A- (recomanada preferentment)

1^{er}) 50% Femelles Madures, a finals de Gener

ATOMINAL 10 EC	750 cc/1000 lts.
SUMICIDIN	600 cc/1000 lts.
IVENOL MASSO	10 lt/1000 lts.

2^o) 8-10 dies després del anterior

SUMICIDIN	600 cc/1000 lts.
IVENOL MASSO	10 lt/1000 lts.

Afegir **COBRE NORDOX 75 WG a 2,0 Kg/1000 lts** a un dels tractaments anteriors

Estratègia -B- (un únic tractament. Cas de poblacions d'adults baixes)

A Finals de Gener

ATOMINAL 10 EC	750 cc/1000 lts.
SUMICIDIN	600 cc/1000 lts.
COBRE NORDOX 75 WG	2,0 Kg/1000 lts.
IVENOL MASSO	10 lt/1000 lts.

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 1

Gener 2012

► Fruïters de Pinyol -Arrufat/Abolladura-

Al Estadi A-B es un moment clau per prevenir els atacs d'Arrufat, doncs a partir d'aquest moment i en cas d'haver-hi pluges les gemes ja son receptives al desenvolupament de la malaltia

Es molt recomanable aprofitar aquest tractament per afegir una piretrina com Akira i oli mineral per combatre les primeres eclosions de pugó verd del presseguer

COBRE NORDOX 75 WG	2,00 Kg/1000 lts
+ AKIRA	0,50 Kg/1000 lts
+ IVENOL Massó	10,00 Lts/1000 lts

Cal recordar que no es pot barrejar Daconil 50 SC i Ivenol, (Oli mineral) i a mes cal esperar entre 15 y 20 dies entre un tractament de **Daconil 50 SC** i un altre d'**Ivenol** (Oli mineral).