

# Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 2

Febrer 2012

## ► Prunera i Cirerer - *Tractament Prefloral* -

Durant l'estadi fenològic C-D s'hauria de fer el tractament prefloral pel control de formes hivernals dels paràsits: Poll de San José, Pugons, Cribat, Arrufat, etc.,..., es recomana tractar amb:

<b>ATOMINAL 10 EC</b>	500 cc/1000 Lts
+	
<b>IVENOL MASSÓ</b>	10 lts /1000 Lts
+	
<b>COBRE NORDOX 75 WG</b>	2 Kg/1000 Lts
+	
<b>AKIRA</b>	500 grs/1000 Lts



## ► Prunera - *Tractament quallat* -

En el cas de la Pruna es indispensable disposar de varietats pol·linitzants compatibles pel quallat, al qual podem ajudar amb alguns tractaments foliars com ara:

**WELGRO® MAR Crema** 150 a 250 cc/Hl

Efectuant entre 2 i 3 aplicacions durant el període de Floració - Quallat

1ª aplicació:	Inici de floració
2ª aplicació	Caiguda de Pètals
3ª aplicació:	10-20 dies mes tard

Una altra alternativa per afavorir quallat seria tractar just abans de floració amb:

**AMCOTONE** 60 grs/Hl

Es pot repetir el tractament al cap de 10-12 dies sempre i quan aquest sigui abans de caiguda de pètals.

## ► Presseguer i Nectarina - *Tractaments preflorals* -

Els tractaments contra pugó cal fer-los acuradament i tenir ben presents algunes consideracions:

- **No tractar mes tard del estadi C-D** (es comença a veure la corol·la), i sobre tot abans que els pugons puguin entrar dintre de les flors un cop es separin els sèpals.

# Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 2

Febrer 2012

- Cal utilitzar volums d'aigua adequats per tal de mullar i recobrir perfectament tot el brancatge. Es recomana emprar al menys 1.000 lts d'aigua/Ha.
- Tractar quan no faci vent

<b>ATOMINAL 10 EC</b>	500 cc/1000 lts
+	
<b>IVENOL MASSÓ</b>	10 lts/1000 lts
+	
<b>DANTOP 50 WG</b>	125 grs/1000 lts
+	
<b>COBRE NORDOX 75 WG</b>	2 Kgs/1000 lts
+	
<b>AKIRA</b>	500 grs/1000 lts



Estadi C



Estadi D

En cas de varietats sensibles a oïdi o cendrosa (sobretot en Nectarina), fer un tractament amb antiòidi específic com ara **MASSOCUR 12,5 EC** 500 cc/1000 lts.

## ► Albercoquer

Durant l'estadi fenològic C-D s'hauria de fer el tractament prefloral pel control de formes hivernals dels paràsits: Poll de San José, Cribat, Arrufat, etc, es recomana tractar amb:

<b>IVENOL® MASSO</b>	10 lts/1000 lts
+	
<b>COBRE NORDOX® 75 WG</b>	2 kgs/1000 lts
+	
<b>AKIRA</b>	500 grs/1000 lts



Estadi D

A les parcel·les i/o varietats sensibles on hi hagi hagut problemes de Monilia es recomana fer un tractament al període de obertura de flors amb algun dels següents productes:



Estadi E



Estadi F

<b>DACONIL® 50 SC</b>	2,5 lts/1000 lts.
(Han de transcorre entre 15-20 dies respecte un tractament d'Oli)	
o	
<b>IPRODIONA Massó</b>	a 1 - 1,5 lts/1000 lts

# Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 2

Febrer 2012

Es pot aprofitar algun d'aquests tractaments per incorporar algun producte per afavorir el quallat, tal como:

**WELGRO® MAR Crema** 150 a 250 cc/HL

Efectuant entre 2 i 3 aplicacions durant el període de Floració - Quallat

1ª aplicació: Inici de floració  
 2ª aplicació: Caiguda de Pètals  
 3ª aplicació: 10-20 dies mes tard

## ► Aportació de quelats, correctors i fertilitzants

A principis del període vegetatiu és el moment de realitzar les aplicacions de quelats i correctors, per tal de que l'arbre ho tingui a disposició quan comença la seva activitat, millorant així l'eficàcia de les aplicacions. Productes i dosis recomanades segons espècie:

	Dosi per Hectàrea	
	<u>Pomera/Perera</u>	<u>Presseguer</u>
ESANTRENE HP	10-12 Kg	12-15 Kg
ó		
FERRUM HQ 5,7	8-10 Kg	10-12 Kg
ó		
MAGNUM HQ Massó	8-10 Kg	10-12 Kg
+		
GROWEL	1-2 Kg	1-2 Kg
+		
STERIC	5 Kg	5 Kg

## ► Normes a tenir presents en els tractaments de fruiters.

- Eviteu tractar amb vent, en períodes de pluja o humitats relatives altes, si es produeixen gelades o bé temperatures inferiors a 8°C.
- Mulleu bé tot l'arbre. **No aplicar volums excessivament baixos d'aigua que comporten mals recobriments i baixes eficàcies.**
- Tracteu sempre amb els productes, estadis fenològics i dosis recomanades per evitar fitotoxicitats.

# Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 2

Febrer 2012

- Entre els tractaments IVENOL (oli mineral) i els de Captan, Daconil i Sofre han de transcorre 21 dies, i també amb tractaments a base de calci (polisulfur de calci) per tal d'evitar fitotoxicitats.
- Cal barrejar els productes dins de la màquina segons el següent ordre, primer posar-hi IVENOL (Oli mineral) i després el COBRE NORDOX 75 WG.

## ► Novetats de Catàleg

---

Us informem que aquest any dins del catàleg de Comercial Química Massó S.A. comptarem amb tres noves incorporacions:

**AKIRA** (2,5% Lambda Cihalotrin) insecticida piretroid amb registre en Fruïters de Llabor (Pomera, Perera) i Fruïters de Pinyol (Presseguer, Nectarina, Prunera, Cirerer, i Albercoquer), entre d'altres

**MAGMA HQ Massó** (6% Fe EDDHMA + 1,5% Zn EDTA + 0,75% Mn EDTA), corrector múltiple de carències, molt indicat per fruïters de pinyol, i pera

Per informació: <http://www.massoagro.com/es/productos/abonos-y-correctores.html>

**PROUSAL ACTIVE.** A base de Lignosulfonat de Calci i Acid Lignosulfònic. Recomanat per la neteja de canonades de reg, reducció de la salinitat de l'aigua i del terra, aporta calci i millora la fertilitat del terra. Podeu consultar el fulletó i el butlletí tècnic a <http://www.massoagro.com/es/productos/productos-especiales.html>