

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 2

Febrer 2013

► Albercoquer

Durant l'estadi fenològic C-D s'hauria de fer el tractament prefloral pel control de formes hivernals dels paràsits: Poll de San José, Cribat, Arrufat, etc, es recomana tractar amb:

IVENOL® MASSO	10 lts/1000 lts
+	
COBRE NORDOX® 75 WG	2 kgs/1000 lts
+	
SUMICIDIN® Extra	300 cc/1000 lts



A les parcel·les i/o varietats sensibles on hi hagi hagut problemes de Monilia es recomana fer un tractament al període de obertura de flors amb algun dels següents productes:



DACONIL® 50 SC	2,5 lts/1000 lts.
(Han de transcorre 15-20 dies respecte un tractament d'Oli)	
o	
IPRODIONA Massó	a 1 - 1,5 lts/1000 lts

Es pot aprofitar algun d'aquests tractaments per incorporar-hi productes per afavorir el quallat, tal com:

WELGRO® MAR Crema	150 a 250 cc/HL
Efectuant entre 2 i 3 aplicacions durant el període de Floració - Quallat	
1ª aplicació:	Inici de floració
2ª aplicació	Caiguda de Pètals
3ª aplicació:	10-20 dies mes tard

► Prunera i Cirerer - Tractament Prefloral-

Durant l'estadi fenològic C-D s'hauria de fer el tractament prefloral pel control de formes hivernals dels paràsits: Poll de San José, Pugons, Cribat, Arrufat, etc, es recomana tractar amb:

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 2

Febrer 2013

ATOMINAL® 10 EC	500 cc/1000 Lts
+ IVENOL® MASSÓ	10 lts /1000 Lts
+ COBRE NORDOX® 75 WG	2 Kg/1000 Lts
+ AKIRA®	500 grs/1000 Lts



► Prunera - Tractament quallat-

En el cas de la Pruna es indispensable disposar de varietats pol·linitzants compatibles pel quallat, hi contribueixen alguns tractaments foliaris com ara:

WELGRO® MAR Crema 150 a 250 cc/Hl

Efectuant entre 2 i 3 aplicacions durant el període de Floració - Quallat

- 1ª aplicació: Inici de floració
- 2ª aplicació Caiguda de Pètals
- 3ª aplicació: 10-20 dies mes tard

Una altra alternativa per afavorir quallat seria tractar just abans de floració amb:

AMCOTONE® 60 grs/Hl

Es pot repetir el tractament al cap de 10-12 dies sempre i quan aquest sigui abans de caiguda de pètals.

► Presseguer i Nectarina - Tractaments preflorals -

Els tractaments contra pugó cal fer-los acuradament i tenir ben presents algunes consideracions:

- No tractar mes tard del estadi C-D (es comença a veure la corol·la), i sobre tot abans que els pugons puguin entrar dintre de les flors un cop es separin els sèpals.
- Cal utilitzar volums d'aigua adequats per tal de mullar i recobrir perfectament tot el brancatge. Es recomana emprar al menys 1.000 lts d'aigua/Ha.
- Tractar quan no faci vent

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 2

Febrer 2013

ATOMINAL® 10 EC	500 cc/1000 lts
+	
IVENOL® MASSÓ	10 lts/1000 lts
+	
DANTOP® 50 WG	125 grs/1000 lts
+	
COBRE NORDOX® 75 WG	2 Kgs/1000 lts
+	
SUMICIDIN® Extra	300 cc/1000 lts



Estadi C



Estadi D

En cas de varietats sensibles a oïdi o cendrosa (sobretot en Nectarina), fer un tractament amb antiòidi específic com ara **MASSOCUR® 12,5 EC** a 500 cc/1000 lts.

► Aportació de quelats, correctors i fertilitzants

A principis del període vegetatiu és el moment d'iniciar les aplicacions de quelats i correctors de carències, per tal de que l'arbre ho tingui a disposició quan comenci la seva activitat, millorant així l'eficàcia de les aplicacions. Productes i dosis recomanades segons espècie:

	Dosi per Hectàrea	
	<u>Pomera/Perera</u>	<u>Fruiters de Pinyol</u>
ESANTRENE® HP	10-12 Kg	10-15 Kg
ó		
FERRUM® HQ 5,7	8-10 Kg	8-12 Kg
ó		
MAGMA® HQ Massó	8-10 Kg	8-12 Kg
+		
GROWEL®	1-2 Kg	1-2 Kg
+		
STERIC® P	5 Kg	5 Kg

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 2

Febrer 2013

► Normes a considerar en els tractaments de fruiters.

- Evitar tractar amb vent, en períodes de pluja o humitats relatives elevades, en cas que es produixin gelades o bé amb temperatures inferiors a 8°C.
- Mullar bé tot l'arbre. **No aplicar volums excessivament baixos d'aigua que comporten mals recobriments i baixes eficàcies.**
- Tractar sempre amb els productes, estadis fenològics i dosis recomanades per evitar fitotoxicitats.
- Entre els tractaments IVENOL® (oli mineral) i els de Captan, Daconil i Sofre han de transcorre 21 dies, i també amb tractaments a base de polisulfurs per tal d'evitar fitotoxicitats.
- Cal barrejar els productes dins de la màquina segons el següent ordre, primer posar-hi IVENOL® (Oli mineral) i després el COBRE NORDOX® 75 WG.

► Novetats de Catàleg

Us informem que aquest any dins del catàleg de Comercial Química Massó S.A. comptarem amb les següents novetats:

SUMICIDIN® Extra (5% Esfenvalerat) insecticida piretroid amb nou registre per **Presseguer/Nectarina**, i **Albercoquer** per control de Pugons, Anarsia, i Grafolita, amb un Termini d'Espera de 3 dies.

TACTIC® (50% Kresoxtim-metil), estrobilirrubina autoritzada en olivera pel control de Repilo ó Ull de gall, i en pera i poma per *Stemphylium*, cendrosa i motejat. També autoritzat en Vinya, Cucurbitàcies, Maduixa, i Solanàcies

FASE® (33% Pendimetalina). Herbicida amb activitat residual, que entre altres conreus està autoritzat per tots els Fruiters, Vivers i Vinya

STERIC® K (6% N - 0% P2O5 - 49% K2O). Fertilitzant cristal·lí ric en Potassi 100% hidrosoluble, amb la tecnologia Steric que garanteix la completa disponibilitat del K per les plantes. Per aplicar via reg localitzat o injectat via rella.