

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 3

Març 2012

► Presseguer, Nectarina

Recordeu que a les varietats de préssec i nectarina sensibles a Trips i Cendrosa cal iniciar els tractaments a finals de floració.



Durant el mes de Març i Abril ens trobem en període de sensibilitat a Arrufat i Cribat en fulla, a més caldrà prevenir els atacs d'Anarsia i Pugó, per tant, s'han de protegir les plantacions a partir de caiguda de pètals amb:

MASSOCUR 12,5 LE	500 cc / 1000 lts d'aigua
+	
DACONIL 50 SC	2,5 lt / 1000 lts d'aigua
+	
SUMICIDIN Extra	300 cc / 1000 lts d'aigua

Recordeu-vos de tractat contra pugó amb un aficida específic d'acció diferent al utilitzat al tractament pre-floral

► Prunera

Durant el període de caiguda de pètals caldrà protegir les plantacions contra Cribat, Pugons i Anarsia. Se aconsella tractar amb:

AKIRA	a	500 grs/1000 lts
+		
BLANCADO	a	2,5 lts/1000 lts
ó		
MACUPRAX	a	2,5 Kgs/1000 lts



En aquelles zones i/o varietats amb problemes de Cendrosa es pot emprar **MASSOCUR** ó **THIOCUR COMBI**

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 3

Març 2012

► Albercoquer

Al període de caiguda de pètals cal continuar protegint les plantacions contra Monilia, i prevenir atacs d'insectes (Anarsia,... etc) es recomana tractar amb:

DACONIL 50 SC a 2,5 lts/1000 Lts

+

SUMICIDIN Extra a 300 cc/1000 Lts

En cas de varietats sensibles a Cendrosa afegir:

MASSOCUR 12,5 EC 500 cc/1000 Lts



► Cirerer

En cas de pluges durant el període de floració, tractar pel control de Monilia amb:

GAVELAN 50 SC 1 - 1,5 Lt/1000 Lts



► Ametller

A partir de caiguda de pètals cal iniciar els tractaments contra Cribat, i vigilar la presència de Pugó als brots mes tendres i tractar al observar els primers brots atacats.

BLANCADO 2-3 Lt/1000 Lts

+

AKIRA o Imidacloprid 500 grs/1000 lts

+


WELGRO STANDARD 2,5 Kg/1000 Lts

ó WELGRO AMINO 2,5 Lt/1000 Lts

► TRACTAMENT PRE-FLORAL EN PERER

Durant el mes de Març ens trobarem els estadis C - D - E- E₂ (vegeu fotos)

En cas de no haver fet cap dels tractaments insecticides recomanats en butlletins anteriors, encara esteu a temps de fer el tractament contra les



Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 3

Març 2012

formes hivernants d'algunes plagues i malalties (Poll de San José, Àcars, Motejat).

IVENOL Massó

10 lts / 1000 Lts

+

ATOMINAL 10 EC

0,5 lts / 1000 Lts

+

COBRE NORDOX 75 WG

2 Kg / 1000 Lts

En aquest període es un bon moment per fer el tractament per control de vigor amb **Pacobutrazol** en aquelles plantacions i/o varietats que fos necessari., el qual es pot afegir si cal al tractament anterior

► PERA. Tractaments de Floració - Quallat

Durant el període de Floració/Quallat es decideixen els rendiments de la propera collita, tant pel que fa a qualitat com a quantitat, cal assegurar un bon quallat, considerant que:

- ✓ Cal suficient presència d'abelles per la pol·linització.
- ✓ Assegurar les necessitats d'aigua, N, P₂O₅ i microelements.
- ✓ Climatologia adequada que faciliti una major fecundació.



Les necessitats nutritives (N, P₂O₅, i microelements) són màximes al període de Floració-Quallat, quan es produeix la màxima divisió cel·lular. Cal que les plantes disposin dels nutrients necessaris i complementar la fertilització al sol, amb tractaments foliaris de macro i microelements

PERLAN® i NOVAGIB®

estant autoritzats per tractaments de quallat en PERA.

Si l'aigua de tractament té pH alcalí (pH > 7), s'aconsella acidificar amb **Welgro® Potasio** o **Welgro® Standard**, sempre que la compatibilitat dels productes ho permeti, ens ajudarà a millorar l'eficàcia dels tractaments de quallat. Si aquest fos el cas, **Welgro** cal incorporar-lo en primer lloc al dipòsit de tractaments.

BLANQUILLA

30% Floració

SET FRUIT® pastillas

5 pastilles/1000 lts

WELGRO® STANDARD

2,5 Kg/1000 lts

WELGRO® MAR Crema

2,0 lts/1000 lts

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 3

Març 2012

70% Floració

SET FRUIT® pastillas	5 pastilles/1000 lts
WELGRO® AMINO	2,5 lts/1000 lts
MASSOCUR® 12,5 EC	0,5 lt/1000 lts
SUMICIDIN®	0,5 lts/1000 lts

Tractament de quallat i control de Motejat i Hoplocampa

CONFERENCE, DOYENE de COMICE

25% Floració

PERLAN®	250 cc/1000 lts
ó NOVAGIB®	500 cc/1000 lts
+ SET FRUIT® Pastillas	1,5 past/1000 lts
+ WELGRO® MAR Crema	1,5 lts/1000 lts
+ WELGRO® BORO DF	2,5 Kg/1000 lts

70% Floració

PERLAN®	250 cc/1000 lts
ó NOVAGIB®	500 cc/1000 lts
+ SET FRUIT® pastillas	1 past/1000 lts
+ WELGRO® MAR Crema	1 lts/1000 lts
+ WELGRO® MICROMIX	1 Kg/1000 lts

ABBATE FETEL

25% Floració

PERLAN®	375 cc/1000 lts
ó NOVAGIB®	750 cc/1000 lts
+ WELGRO® MAR Crema	1,5 lts/1000 lts
+ WELGRO® BORO DF	2,5 Kg/1000 lts

70% Floració

PERLAN®	375 cc/1000 lts
ó NOVAGIB®	750 cc/1000 lts
+ WELGRO® MAR Crema	1,5 lts/1000 lts
+ WELGRO® MICROMIX	1 Kg/1000 lts

En cas de que la floració sigui molt concentrada en el temps pot ser recomanable efectuar un únic tractament. En aquest cas la dosi de **NOVAGIB®** i/o **PERLAN®** serà la suma del 1^{er} i 2^o tractament.

LIMONERA, WILLIAMS i BARLET

50% Floració:

AMCOTONE®	600 gr/1000 lts
WELGRO® AMINO	2,5 lt/1000 lts



Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 3

Març 2012

ALTRES VARIETATS

Els tractaments de quallat amb **SET FRUIT® pastillas** per altres varietats de pera es recomanen a les següents dosis:

ALEXANDRINA	30% y 100% Floració	2 past/1000 lts
BUENA LUISA	30% y 100% Floració	2 past/1000 lts
PASSA CRASSANA	30% y 80% Floració	3-5 past/1000 lts
DEVOE	80% Floració	2-3 past/1000 lts
ERCOLINI	50% Floració	2 past/1000 lts
GENERAL LECLREC	50% Floració	2-4 past/1000 lts

En tots els casos afegir:	WELGRO® STANDARD	2,5 Kg/1000 lts
	WELGRO® MAR Crema	2,0 lts/1000 lts

RECOMANACIÓ EN CAS DE GELADES

Si es produïssin gelades durant el període de floració quallat i es fes necessari tractar per assegurar el quallat recordem que els productes a emprar són:

SET FRUIT® Pastillas + WELGRO® AMINO ó WELGRO® Mar Crema
no son efectius els tractaments amb Giberelines A₄/A₇

► Pomera - Tractament prefloral -

Durant la 2ª quinzena del Març arribarem l'estadi fenològic C₃ - D, en el que es recomana tractar per combatre formes hivernants de paràsits i malalties com: Poll de San José, Àcars, Pugons, Mota, Cendrosa,... El tractament recomanat a efectuar serà:

ATOMINAL 10 EC	500 cc / 1000 Lts
+	
IVENOL MASSÓ	10 Lt / 1000 Lts
+	
COBRE NORDOX 75WG	2 Kg / 1000 Lts
+	
MASSOCUR 12,5 EC	0,5 Lt / 1000 Lts



En cas de finques amb antecedents de problemes de pugó gris o Dysaphis afegir aficida específic al tractament anterior.

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 3

Març 2012

► Tots els fruiters

En aquelles plantacions amb problemes de Phytophthora es pot efectuar un tractament radicular a través del sistema de reg localitzat a partir del 2º reg amb:

ALEXIN 2,5 Kg/Ha

► Olivo

A partir del moment que s'iniciï la nova brotada, efectuar un tractament amb:

COBRE NORDOX 75 WG 2 Kg/1000 Lts

+

WELGRO BORO 4 Kg/1000 Lts

+

WELGRO AMINO 2,5 Lts/1000 Lts

► Aportació de quelats, correctors i fertilitzants

A principis del període vegetatiu és el moment de realitzar les aplicacions de quelats i correctors. Productes i dosis recomanades segons espècie:

	<u>Pomera/Perera</u>	<u>Presseguer</u>
ESANTRENE HP	10-12 Kg/Ha	12-15 Kg/Ha
ó		
FERRUM HQ 5,7	8-10 Kg/Ha	10-12 Kg/Ha
ó		
MAGMA HQ Massó	8-10 Kg/Ha	10-12 Kg/Ha
+		
GROWEL	1-2 Kg/Ha	1-2 Kg/Ha
+		
STERIC	5 kg/Ha	5 Kg/Ha

Correctors segons carències (opcional): Pomera/Perera/Presseguer

WELGRO MANGANESO 5 Lts/Ha

WELGRO ZINC 5 Lts/Ha

WELGRO Zn + Mn 2-3 Kg/Ha

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 3

Març 2012

► Normes a tenir presents en els tractaments de fruiters.

- Eviteu tractar amb vent, amb períodes de pluja o humitats relatives altes, si es produeixen gelades o bé temperatures inferiors a 8°C.
- Mulleu bé tot l'arbre. **No aplicar volums excessivament baixos d'aigua que comporten tractaments amb males cobertures i baixes eficàcies.**
- Tracteu sempre amb els productes, estadis fenològics i dosis recomanades per evitar fitotoxicitats.
- Entre els tractaments d'OLI D'ESTIU (IVENOL Massó) i els de Captan, Daconil i Sofre han de transcorre 21 dies, i també amb tractaments a base de calci (polisulfur de calci) per tal d'evitar fitotoxicitats.
- Cal barrejar els productes dins de la màquina segons el següent ordre, primer posar-hi l'OLI D'ESTIU (IVENOL Massó) i després el COBRE NORDOX 75 WG.
- Per aquells productes l'eficàcia dels quals està condicionada pel pH de l'aigua de tractament, i per als que es recomana l'ús de acidificants o tamponadors de pH, aquests productes son els que primer s'han d'incorporar al dipòsit de tractaments.