

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 6

Abril 2012

► ESPECIAL CIRERA. Tractaments Prevenció Cracking

Les varietats més primerenques de cirera han iniciat el canvi de coloració, època a partir de la qual, si es produeixen pluges, les varietats de cirera sensibles al cracking poden veure's afectades per aquesta fisiopatia

L'aplicació preventiva de **GREENSTIM** a base de Glicina-Betaina, molècula que forma part d'un grup denominat **OSMOREGULADORS**, permet reduir la incidència del cracking a les cireres.

De les condicions d'aplicació del producte destaca que per aconseguir una bona eficàcia en la prevenció del Cracking, cal tenir present els següents aspectes:

1º) El moment de tractament es fonamental.

**CANVI DE COLOR
DE VERD a GROC PALLA**

2º) Cal l'adició d'un bon mullant i/o penetrant

3º) Han de transcórrer al menys 48 hores entre el tractament i possibles pluges posteriors.



Foto 1 .- Color fruit al moment del tractament

La recomanació de tractament es:

GREENSTIM 400 grs/Hl

+

MOGIOL o Mullant especial (consultar)

Generalment per la prevenció del Cracking es suficient un sol tractament per varietat, la persistència del tractament es d'uns 20 dies. En el cas de que transcorrin mes dies entre el tractament i la collita pot esser necessari fer un 2º tractament, en aquest cas es pot emprar una dosi de 250 grs/Hl