

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 7

Maig 2012

► Perera

Entre finals d'abril i primers de maig s'ha iniciat el vol de la primera generació de **Carpocapsa**, i en 10-15 dies dependent de les temperatures sortiran les primeres larves. El llindar de **Carpocapsa** en trampa Delta es de 4 adults/trampa/setmana.

| | | |
|------------------|---|--------------|
| AKIRA | a | 50-75 grs/Hl |
| SUMICIDIN | a | 50-100 cc/Hl |

Ens trobarem en el moment de tractar **Fil·loxera**, per tant, caldrà efectuar un tractament i repetir-lo als 10-15 dies amb.

Les condicions climàtiques dels darrers dies han comportat risc de **Motejat** i **Stemphylum**. Cal protegir les varietats sensibles a **Motejat** com **Blanquilla**, **Magallon**, etc; i les varietats sensibles a **Stemphylum** com **Conference**, **Alexandrina**, **Abatte Fetel**, **Flor d'hivern**, amb algun dels productes següents, que podem afegir al tractament insecticida anterior:

| <u>Productes per Motejat</u> | | <u>Productes per Stemphylium</u> | |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| MASSOCUR 12,5 EC | a 50 cc/Hl | DACONIL 50 SC | a 250 cc/Hl |
| DACONIL 50 SC | a 250 cc/Hl | IPRODIONA | a 100-150 cc/Hl |
| CAPTAN 47,5 Massó | a 250 cc/Hl | | |

Durant el mes de maig es produirà l'eclosió de la segona generació de **psil·la**, i la presència de pugó als brots tendres. Cal vigilar els brots i tractar quan s'observi la seva presència amb:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| ROMECTIN ⁽¹⁾ | a 100 cc/Hl |
| DANTOP 50 WG | a 15-22,5 grs/Hl |

(a dosis altes a mes de pugó controla Psila)

ASPID

Sols o en barreja entre ells, segons s'observi presència de posta, i/o primeres eclosions (nimfes N₁-N₃), o nimfes mes evolucionades

► Pomera

Cal iniciar els tractaments contra la 1^{era} generació de **Carpocapsa** amb algun dels següents productes que també són eficaços per Capues i rosegadors de pell de la poma

| | | |
|------------------|---|--------------|
| AKIRA | a | 50-75 grs/Hl |
| SUMICIDIN | a | 50-100 cc/Hl |
| ASPID | | |

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 7

Maig 2012

Aquest tractament s'ha de repetir cada 10 - 15 dies en funció del nivell de plaga de cada finca, sempre que es superi el llindar de 3 adults/trampa/setmana en trampa Delta. Si el nivell de captures d'adults supera els 20 per trampa/setmana, barrejar insecticida organofosforat i piretrina

Un cop finalitzada la caiguda de pètals es poden iniciar els tractaments pel control d'**Aranya Roja (Panonychus urticae)** a totes les varietats de poma amb:

ROMECTIN ⁽¹⁾ a 100 cc/Hl
ó

MILBEKNOCK a 100-150 cc/Hl (amb aquest producte en Golden es necessari esperar a tractar a finals de Maig per tal d'evitar períodes d'humitats prolongats i forts contrastos tèrmics). Afegir un mullant penetrant en cas de forta presència d'aranya. No barrejar amb Daconil.

Les condicions climàtiques dels darrers dies han comportat diferents nivell de risc de Motejat, per tant caldrà protegir les varietats sensibles a **Motejat** amb algun dels productes recomanats a continuació, que també son eficaços per **Cendrosa**

MASSOCUR 12,5 EC a 50 cc/Hl

THIOCUR COMBI a 500-750 gr/Hl (no emprar en varietats del Grup Red Decicious i spurs -rogues americanes-)

Segons el risc de motejat caldrà afegir-hi un fungicida orgànic

DACONIL 50 SC a 250 cc/Hl

CAPTAN 47,5 Massó a 250 grs/Hl

*(1) Recordar la necessitat d'emulsionar **ROMECTIN** amb **IVENOL Massó** (oli parafínic) o amb un bon coadjuvant (consultar), abans incorporar el producte a l'aigua de tractament.*

Tractaments preventius Bitter-pit

S'ha d'aportar calci de manera regular per elevar el contingut d'aquest element mineral en els fruits. Es poden aplicar algun dels següents productes:

WELGRO CALCIO (Via foliar) 200-300 cc/Hl

PROUSAL (Via goter) 1-2 Lts./Tm de producció esperada repartit durant el període que va de quallat fins 40-50 dies després

PROUSAL ACTIVE (via goter) 20-40 Lts/Ha segons necessitats. A mes te efecte netejador de canonades

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 7

Maig 2012

► Presseguer, Nectarina, Prunera i Albercoquer

Cal vigilar si es produeixen noves infestacions de Pugó verd (*Myzus persicae*) en Presseguer i Nectarina, tractar al observar els primers símptomes amb

DANTOP 50 WG a 140 grs/Ha

Durant el mes de Maig caldrà tractar la 1^{era} generació d'**Anàrsia** i **Grafolita**.

AKIRA a 50-75 gr/Hl

Tractament que caldrà repetir cada 10-15 dies, segons el nivell de plaga de cada finca, i sempre que es superin el llindar de 7 adults/trampa/setmana en cas d'**Anàrsia**, i de 14 adults/trampa/setmana en **Grafolita**, en captures d'adults en trampa Delta.

Encara ens trobem en el període sensible del fruit a **Cendrosa** i dels brots a **Arrufat** i **Cribat**, per tant, s'han de protegir les plantacions cada 12 - 15 dies amb:

MASSOCUR 12,5 EC a 50 cc/Hl

ó **THIOCUR COMBI** a 500 grs/Hl

+

DACONIL 50 SC a 250 g/Hl (no autoritzat en prunera)

► Presseguer - Albercoquer - Prunera - Cirerer

Alerta a les varietats pròximes a collita, vigileu el problema de Podrits de fruits (**Botritis**, **Monilia**, **Rizopus**)

DACONIL 50 SC a 250 cc/Hl Només per Albercoc i Préssec amb 15 dies de Termini de Seguretat (T.S.)

IPRODIONA Massó a 100-150 cc/Hl T.S. 3 dies: Albercoc, Cirera, Préssec
14 dies: Pruna

Cal estar alerta de possible presencia de la nova plaga de Mosca de la fruits (*Drosophyla Suzukii*) especialment en cirerer. En cas que es detecti la seva presencia es poden utilitzar els següents productes:

QUIMATO 40 a 75 cc/Hl (autorització excepcional fins el 20/07/12)
(Termini de seguretat: 21 dies)

AKIRA a 75 grs/Hl (Termini de seguretat: 7 dies)

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 7

Maig 2012

► Fruïters en General.

Durant aquest mes es pot fer el tractament contra **Mal de coll** (*Phytophthora cactorum*), i **Xanques de coll**, amb:

| | | | |
|---------------------|---|-----------|----------------------|
| ALEXIN 95 PS | a | 250 gr/Hl | (via foliar) |
| ALEXIN 95 PS | a | 2,5 Kg/Ha | (via reg localitzat) |

► Olivera

Es recomana un tractament pre-floral pel control de **Caparreta** (*Saissetia*), **Prays**, i preventiu de **Repilo** (*Ull de gall*):

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| ATOMINAL 10 EC | a | 25 cc/Hl |
| + | | |
| COBRE NORDOX 75WG | a | 200 g/Hl |
| + | | |
| WELGRO Mar Crema | a | 200 cc/Hl |
| + | | |
| WELGRO BORO | a | 250 grs/Hl |

Si teniu problemes d'esgrogueïment de les fulles us recomanem substituir **WELGRO BORO** per **WELGRO COMPLEX OLIVO** a raó de 200 g/Hl.