

# Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 9

Octubre 2013

## ► FRUITERS EN GENERAL

Durant el període de caiguda de fulla es produeixen petites ferides per on poden penetrar fongs i bacteris com: *Monilia*, *Cribat*, *Cytospora*, *Fusicocum*, *Abolladura*, en Fruiters de pinyol, i *Motejat*, *Septoria*, *Stemphiliium*, *Xancres*, *Pseudomonas*, etc, en Fruiters de llavor, que es veuen afavorides per pluges, rosades i boires.

Per altra banda i donat el increment de casos detectats de FOC BACTERIÀ en Perera i Pamera fa mes necessari que mai els tractaments de caiguda de fulla amb Coure, que mes a mes ens serviran pel control de les malalties esmentades anteriorment:

**COBRE NORDOX® 75 WG**                      200 grs/Hl

1 <sup>er</sup>	Inici caiguda de Fulla
2 <sup>on</sup>	50% de Caiguda de Fulla
3 <sup>er</sup>	100% de Caiguda de Fulla

Per el control de la Bacteriosis (*Xantomonas pruni*) en plantacions de Fruiters de pinyol es recomana efectuar 2 tractaments a caiguda de fulla els quals cal complementar amb un tractament quan s'inflin els borrons de flor (Estadi A-B, finals de Gener-Febrer) i un altre a botó rosa (Estadi E) també amb **COBRE NORDOX® 75 WG**

En aquelles finques amb problemes greus de *Motejat* i/o *Stemphiliium* durant la passada campanya fruitera es molt recomanable afegir al 2º ó 3<sup>er</sup> tractament: UREA FOLIAR a una dosi de 5 kg/Hl., segons problemàtica, per tal de contribuir a la descomposició de les fulles.

## ► OLIVERA

En moltes zones s'ha començat ja la recol·lecció de les olives.

En aquest butlletí us volem fer memòria que resulta imprescindible tractar amb fungicides cúprics després de recol·lecció mecànica, a fi efecte de cicatritzar les ferides que provoca la maquinaria de recol·lecció, principalment aquelles recol·lectades amb màquines vibradores.

Tractar d'immediat després de la collita amb:

**COBRE NORDOX 75 WG**                      200 grs/Hl