

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 8

Juny 2012

► Perera

S'està iniciant la 3ª Generació de Psila, es recomana tractar quan ens trobem entre el màxim de posta i inici d'eclosió de larves.

ROMECTIN a 100 cc/Hl

*Recordar la necessitat d'emulsionar **ROMECTIN** amb **Ivenol** (oli parafínic) o amb un bon coadjuvant, abans incorporar el producte a l'aigua de tractament.*

Es pot barrejar amb algun dels insecticides següents per control de pugons o carpocapsa:

DANTOP 50 WG a 15 gr/Hl (a Dosi màxima de 225 grs/Ha, controla Psila. Una única aplicació per campanya)

AKIRA a 50-75 grs/Hl (Carpocapsa)

SUMICIDIN a 50-100 cc/Hl (Carpocapsa)

Si es donen condicions climàtiques favorables de **Motejat** caldrà tractar aquelles varietats sensibles (Blanquilla, Magallona, etc).

MASSOCUR 12,5 EC a 50 cc/Hl

DACONIL 50 SC a 250 cc/Hl

CAPTAN 47,5 Massó a 250 gr/Hl

Continuar els tractaments preventius de **Stemphilium** a varietats com Conference, Alexandrina, Abatte Fetel, Flor d'hivern, efectuant tractaments periòdics amb:

DACONIL 50 SC a 250 cc/Hl

IPRODIONA a 100-150 cc/Hl

► Pomerà

Cal continuar amb la protecció de les plantacions del atac de **Carpocapsa**. El llindar de tractament en trampa Delta és de 3 adults/trampa/setmana. Caldrà efectuar els tractaments quan es superi aquest llindar.

AKIRA a 50 grs/Hl

SUMICIDIN a 50-100 cc/Hl.

ASPID 50 WP (imprescindible acidificar l'aigua de tractament amb W.Standard ó Potasio)

Si es supera els 20 adult/trampa/setmana, barrejar Aspid amb Akira o Somicidin.

Aquelles plantacions amb presència de taques de motejat en fulles i/o fruits s'hauran d'anar protegint fins a collita, es pot emprar

MASSOCUR 12,5 EC a 50 cc/Hl

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 8

Juny 2012

DACONIL 50 SC a 250 cc/Hl

CAPTAN 47,5 Massó a 250 gr/Hl

En les finques que no s'observi la presència de motejat, només s'hauran de tractar si es produeix un perill greu de la malaltia, tot i que s'ha de continuar protegint contra **Cendrosa**.

MASSOCUR 12,5 EC a 40-60 cc/Hl

Cal vigilar les finques amb antecedents i/o problemes d'**Aranya (Panonichus ulmi, Tetranychus urticae)**, i tractar amb algun dels següents productes:

MILBEKNOCK a 100-150 cc/Hl

Afegir un penetrant en cas de forta presència d'aranya que ajudi a penetrar el producte a la fulla i evitar la degradació per la llum. No barrejar amb Daconil.

ROMECTIN a 100 cc/Hl

*Recordar la necessitat d'emulsionar **ROMECTIN** amb **Ivenol** (oli parafínic) o amb un bon coadjuvant, abans incorporar el producte a l'aigua de tractament.*

Tractaments preventius Bitter-pit

S'ha d'aportar calci de manera regular per elevar el contingut d'aquest element mineral en els fruits. Es poden aplicar algun dels següents productes:

WELGRO CALCIO (Via foliar) 200-300 cc/Hl

PROUSAL (Via goter) 1-2 Lts./Tm de producció esperada repartit durant el període que va de quallat fins 40-50 dies després

PROUSAL ACTIVE (via goter) 20-40 Lts/Ha segons necessitats. A més te efecte netejador de canonades

► Presseguer, Nectarina , Prunera i Albercoquer

Durant tot el mes de juny s'han de protegir les finques contra les larves d'**Anàrsia** i **Grafolita**, tractament que caldrà repetir cada 10 - 15 dies, segons el nivell de plaga, i sempre que es superin el llindar de 7 adults/trampa/setmana en cas d'**Anàrsia**, i de 14 adults/trampa/setmana en **Grafolita**, en captures d'adults en trampa Delta.

AKIRA a 50 grs/Hl

La presència de **Mosca de la Fruita (Ceratitis)**, en aquests moments és nul·la, però caldrà està alerta de les captures en trampes i efectuar un tractament a totes les varietats que estiguin pròximes a collir.

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 8

Juny 2012

En plantacions que es trobin en fase de formació, continuar amb el control de pugó i **Mosquit verd** (*Empoasca sp.*). Aquest tractaments també es eficaç pel control de Capnodis (Capgros).

DANTOP 50 WG a 12,5 grs/Hl (140 grs/Ha)

En les varietats pròximes a collita, vigileu els fongs de Podrits de fruits (**Botritis, Monilia, Rizopus**), és recomana el següent calendari de tractaments:

1º) 30 dies abans de collita

DACONIL 50 SC a 250 cc/Hl T.S. 15 dies en Albercoquer i Presseguer

2º) 15 dies abans de collita

IPRODIONA Massó a 150 cc/Hl T.S. 3 dies en Albercoquer, Presseguer
+
14 dies en Prunera

DACONIL 50 SC a 250 cc/Hl T.S. 15 dies en Albercoquer i Presseguer

3º) 3-5 dies abans de collita

IPRODIONA Massó a 150 cc/Hl T.S. 3 dies en Albercoquer, Presseguer

► Fruïters en General.

Durant aquest mes es pot el tractar contra **Mal de coll** (*Phytophthora cactorum*), i **Xancre de coll**, amb:

ALEXIN 95 PS a 250 gr/Hl (via foliar)

ALEXIN 95 PS a 2,5 Kg/Ha (via reg localitzat)

► Olivera

A les zones on el **Prays** es plaga important, quan s'iniciï l'eclosió de la 2ª Generació, que es la que ataca directament a l'oliva, i provoca la caiguda de l'oliva a finals de Setembre (Caiguda de Sant Miquel). Es pot emprar algun dels següents productes:

ASPID 50 WP a 200 grs/Hl (imprescindible afegir Welgro Standard per acidificar el pH de l'aigua).

QUIMATO 40 a 100-150 cc/Hl

En plantacions joves (1 - 3 anys) cal estar atents als atacs de Glifodes, els productes anteriors també serveixen per aquesta plaga

**- CAL RESPECTAR EL TERMINI DE SEGURETAT
DELS PRODUCTES FITOSANITARIS -**