

INFORMATIU DE TRACTAMENTS HERBICIDES EN PANÍS

RELACIÓ DE PRODUCTES:

- ◆ CLORIFOS 5 %
- ◆ CLORIFOS 48 %
- ◆ SUMICIDIN SU
- ◆ DASKOR

- ◆ ACETAPRON EXTRA
- ◆ HERBEL
- ◆ PRIMEXTRA
- ◆ CAMIX
- ◆ BANDERA
- ◆ TOMCAT MAIZ
- ◆ CALLISTO
- ◆ FLURXIPIR
- ◆ BANVEL D
- ◆ BROMOXINIL

- ◆ W.AMINO
- ◆ LAST-N
- ◆ STERIC P

ÈPOCA	Herbes principals a controlar	TRACTAMENT	DOSIS/ha.
Pre-emergència	<i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Setaria vertilicilata</i> <i>Setaria adhaerens</i> <i>Xanthium strumarium</i> <i>Polygonum aviculare</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Sinapis arvensis</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Amaranthus retro</i> <i>Portulaca aleracea</i>	ACETAPRON Extra (Acetocloro 45% + Terbutilazina 21,4%) ò PRIMEXTRA GOLD (S-Metolaclor 31,25% +Terbutilazina 18,75)	5 L
Pre-Emergència	Herbes anteriors mes: <i>Abutilon theophrasti</i> <i>Cyperus rotundus</i> i millorem control d'altres herbes com: <i>Datura</i> , <i>Xanthium,digitaria</i> .	ACETAPRON Extra ò PRIMEXTRA GOLD + CAMIX (Mesotriona 4% + S-metolacloro 40%)	5 L
Post-emergència Primerenca	Herbes anteriors primer bloc nascudes en estadi de cotiledons.	CAMIX +	4 L
Fins estadis de tres fulles		BANDERA	1 L
Post-emergència	<i>Sorghum haltepense</i> <i>Setaria vertilicilata</i> <i>Setaria adhaerens</i> <i>Poa annua</i> <i>Echinochloa crus-galli</i>	BANDERA (Nicosulfuron 4%)	1,5 L
Post-emergència	<i>Datura stramonium</i> <i>Abutilon theophrasti</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Cyperus rotundus</i> i altres	CALLISTO (Mesotriona 10%)	1,5 L
Post-emergència	<i>Sorghum halepense</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Abutilon theophrasti</i> <i>Chenopodium album</i> <i>Cyperus rotundus</i> i altres	BANDERA + CALLISTO	1 L
			1 L